

Инструкция по применению препарата Velpanat (комбинация софосбувир и велпатасвир).

Состав:

Комбинация включает софосбувир (400 мг) и велпатасвир (100 мг) в каждой таблетке, для перорального применения.

Показания к использованию:

Для лечения взрослых пациентов с хроническим ВГС генотипа 1,2,3,4,5,6 без цирроза или с компенсированным циррозом. Для пациентов с декомпенсированным циррозом используется комбинация с Рибавирином.

Способ применения и дозы:

Рекомендуется употребление 1 таблетки (400 мг софосбувира, 100 мг велпатасвира) в сутки, с пищей, либо без пищи.

Курс терапии для пациентов без цирроза либо с компенсированным циррозом составляет 12 недель. Для пациентов с декомпенсированным циррозом курс приема составляет 12 недель в сочетании с Рибавирином.

Меры предосторожности:

При одновременном применении амиодарона риск возникновения брадикардии. В группе риска пациенты, получающие бета-блокаторы, и люди с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями и/или прогрессирующими заболеваниями печени. Одновременный прием комбинации софосбувира и велпатасвира и Амиодарон не рекомендуется. В случае, если альтернативы лечения нет, пациенту рекомендован мониторинг сердца. Брадикардия, как правило, прекращается после отмены препарата. Пациентам, у которых развиваются признаки или симптомы брадикардии, немедленно следует обратиться за медицинской оценкой состояния здоровья. Симптомы могут включать в себя обмороки или обморочные состояния, головокружение, недомогание, слабость, повышенную утомляемость, одышку, грудные боли, спутанность сознания или проблемы с памятью.

Не рекомендуется прием препарата детям (влияние не изучено), во время беременности и лактации.

Побочные реакции:

Наиболее частыми побочными реакциями (частота больше или равна 10%) при лечении комбинацией софосбувира и велпатасвира в течение 12 недель являются головная боль и усталость.

Наиболее частыми побочными реакциями (частота больше или равна 10%) при лечении комбинацией софосбувира, велпатасвира и Рибавирина в течение 12 недель у пациентов с декомпенсированным циррозом являются усталость, анемия, тошнота, головная боль, бессонница и диарея.